

Procedura pobrania śliny

Zadbaliśmy o to, aby **wszystkie produkty w naszej ofercie były oparte o ślinę**.



Ślina lub wymaz z policzka klienta **pobierany jest w łatwy, bezbolesny sposób** (plujemy do niewielkiego pojemnika lub używamy wacika).



Próbka wraz z podstawowym wywiadem jest **wysyłana do naszego laboratorium**.



Próbka jest **analizowana w naszym laboratorium** za pomocą automatycznych platform.



Wyniki **przekazywane są przez e-mail** bezpośrednio do lekarza, trenera, dietetyka lub klienta.

CZAS OD POBRANIA MATERIAŁU DO UZYSKANIA WYNIKU WYNOŚI MAX 14 DNI

WYGRAJ WALKĘ Z ŁYSIENIEM!



test
łysienie
androgenowe

Żyj zgodnie
ze swoim DNA



Chroń swoje włosy już teraz!
WYKONAJ TEST!

www.biogenpolska.pl
Grupa Biogenoma

www.biogenpolska.pl
Grupa Biogenoma

Łysienie androgenowe (AGA) to najczęstsza przyczyna nadmiernego wypadania włosów. W większości przypadków u jego podstaw leżą indywidualne uwarunkowania genetyczne związane ze zmianami w genie receptora androgenowego (AR). Często pierwsze objawy łysienia są ignorowane przez kobiety, które przypisują utratę włosów nadmiernej pielęgnacji czy zbyt intensywnym zabiegom fryzjerskimi. Jednak wypadanie włosów może być objawem wielu poważnych chorób dermatologicznych lub endokrynologicznych. Wczesne postawienie właściwej diagnozy jest ważne zarówno ze względów estetycznych, jak i zdrowotnych.

Test na Łysienie Androgenowe

- Określa ryzyko wystąpienia i rozwoju łysienia androgenowego. Wykrycie podatności genetycznej na łysienie androgenowe pomaga w postawieniu właściwej diagnozy i doborze odpowiednich metod zapobiegania nadmiernej utracie włosów.
- Pozwala na wykrycie łysienia androgenowego nawet przed wystąpieniem objawów, kiedy interwencja ma największe szanse powodzenia.
- Pokazuje indywidualną podatność na ewentualne leczenie finasterydem. Terapia finasterydem to jedna z najbardziej efektywnych metod walki z AGA, której skuteczność u kobiet jest potwierdzana przez coraz większą liczbę badań. Nasz test sprawdza, czy tego typu leczenie zadziała.

Procedura PCR

Badanie na obecność zmian w genie receptora androgenowego

CHROMOSOM X: gen receptora androgenowego



WYSOKIE RYZYKO
Wariant +



Prawdopodobieństwo rozwoju łysienia androgenowego wynosi do 80 proc. Liczba powtórzeń CAG jest niższa, co oznacza większe szanse na pozytywne efekty leczenia finasterydem.

NISKIE RYZYKO
Wariant -



Prawdopodobieństwo, że łysienie androgenowe się nie rozwinie wynosi nawet 90 proc. Za utratę włosów odpowiadają więc inne czynniki.

test
łysienie
androgenowe